



## Sjekkliste prehospital trombolyse – skal følge pasient

Etternavn / Fornavn:	K	M	Personnummer:
Vekt (kg):	Alder (år):	Kommune:	Amis nr.:

EKG VURDERING AV LEGE											
Primærlege	Sykehuslege				Legens navn:						
EKG:	Sinusrytme			Smalkomplekset			Bredkomplekset rytme		Ve.sidig grenblokk (nyoppstått)		
ST-hevning i avledning:	I	II	III	aVL	aVF	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>	V <sub>4</sub>	V <sub>5</sub>	V <sub>6</sub>

INDIKASJONER		
JA	NEI	<p>Akutte, sentrale brystmerter, evt med utstråling, Akutte, sentrale brystmerter, evt med utstråling, som ikke reagerer på Nitroglyserin. Nitroresistente smerter. (Se tiltakskort 18617 Trombolyse Finnmark)</p> <p>Atypiske brystmerter sees gjerne hos kvinner, eldre, demente, pasienter med kronisk nyresykdom og diabetes. Disse symptomene kan være: Følelse av tretthet og kortpustethet, smerter rygg, nakke, bryst, ubehag øverst i mage med kvalme og kaldsvett.</p> <p>ST-elevasjon i minst 2 tilgrensede avledninger på EKG.</p>

KONTRAINDIKASJONER MOT TROMBOLYSE		
JA	NEI	Tidligere hjerneblødning eller hjerneslag uten kjent årsak
JA	NEI	Iskemisk hjerneslag siste 6 mnd.
JA	NEI	Intrakraniell skade, tumor eller arteriovenøs malformasjon
JA	NEI	Større traume, kirurgi eller hodeskade siste 4 uker
JA	NEI	Blødning fra mage/tarm siste 4 uker
JA	NEI	Kjent blødningsforstyrrelse
JA	NEI	Aortadisseksjon
JA	NEI	Ikke-komprimerbar vevsprøve (punksjon/biopsi) siste 24 timer



RELATIVE KONTRAINDIKASJONER		
Trombolyse kan gis dersom sterk indikasjon – konferer via AMK-FIN		
JA	NEI	Tia siste 6 mnd.
JA	NEI	Antikoagulasjon behandling
JA	NEI	Graviditet eller første uke etter fødsel (1 uke postpartum)
JA	NEI	Vedvarende hypertensjon: Systolisk.BT over 180 Diastolisk BT over 110 <u>etter</u> MONA behandling
JA	NEI	Langt kommet leversykdom
JA	NEI	Infeksiøs endokarditt – mistanke
JA	NEI	Langvarig resuscitering

**Sett ring rundt dose som er gitt:**

1. PLAVIX 300 mg po om under 75 år		Klokken gitt	Signatur			
1. PLAVIX 75 mg po om over 75 år						
2. KLEXANE 30 mg (0,3 ml) iv om under 75 år		Klokken gitt	Signatur			
3. METALYSE 1000 enheter/ml						
NB: Om konferert med lege hos pasient over 75 år – Kun lege kan beslutte halv dosering.						
Vekt (kg)	u/75 år	o/75 år	u/75 år	o/75 år	Klokken gitt	Signatur
	ml		IE (units)			
Under 60	6	3	6000	3000		
60 – 70	7	3,5	7000	3500		
70 – 80	8	4	8000	4000		
80 – 90	9	4,5	9000	4500		
Over 90	10	5	10 000	5000		
4. KLEXANE						
1 mg/kg sc. <u>under 75 år.</u> 0.75 mg/kg <u>over 75 år</u> Tabell: Avrundet dose i hht retningslinjer						
Maks 100 mg til alle (etter iv dose med Metalyse)						
	u/75	o/75 år	u/75	o/75 år	Klokken gitt	Signatur
Vekt (kg)	ml		mg			
50 – 60	0,6	0,4	60	40		
60 – 70	0,7	0,5	70	50		
70 – 80	0,8	0,6	80	60		
80 – 90	0,9	0,7	90	70		
Over 90	1,0	0,8	100	80		