

Til pasienten

Sykehusene har besluttet at pasienter i LAR som bruker metadon mikstur, buprenorfin eller buprenorfin/nalokson tablett bytter til rimeligste variant. Dette fordi legemidlene har lik virkning og pengene man sparer går til å behandle flere pasienter.

DU BRUKER METADON MIKSTUR

Nytt navn på din medisin er: **Metadon Nordic drugs**.



Medisinen har samme effekt og er godkjent av legemiddelmyndighetene i Norge. Du kan oppleve de samme bivirkningene som med din gamle mikstur.

DU BRUKER BUPRENORFIN

Nytt navn på din medisin er: **Buprenorphine Orifarm**.



Medisinen har samme effekt og er godkjent av legemiddelmyndighetene i Norge. Du kan oppleve de samme bivirkningene som med din gamle tablett. Observasjonstid for buprenorfin skal ikke overstige 5 minutter.

DU BRUKER BUPRENORFIN/NALOKSON

Nytt navn på din medisin er: **Subuxone Indivior**.



Medisinen har samme effekt og er godkjent av legemiddelmyndighetene i Norge. Du kan oppleve de samme bivirkningene som med din gamle tablett. Observasjonstid for Subuxone Indivior skal ikke overstige 5 minutter.

Står du på metadon tablett trenger du ikke bytte medisin.

Hvorfor blir jeg anbefalt å bytte?

Din nye LAR-medisin er like trygg og god som din tidligere medisin, men har en lavere pris. Siden LAR-

medisinene skal virke like bra, anbefaler sykehusene å bruke de rimeligste. Sykehusene får da penger som de vil bruke på å behandle flest mulig pasienter. Disse pengene ville ellers gått til legemiddelfirmaene.

Er førstevalget like trygt som de andre preparatene?

Ja. Forskjellene mellom medisinene kan være ulikt navn, utseende, ulike hjelpestoffer og tekst i pakningsvedlegget.

Hvordan skal byttet foregå?

Legen din vil kalle deg inn til time og skrive ut ny resept, og den gamle resepten slettes. Dette vil skje innen 31. desember 2018.

Må andre pasientgrupper bytte medisiner?

Ja. De siste årene har flere pasientgrupper byttet til rimeligere medisiner, der det fins flere alternativer med samme effekt og bivirkninger.

Hvem skal ikke bytte?

Hovedregelen er at flest mulig skal benytte førstevalget, men hos noen er det likevel medisinske grunner til at førstevalget ikke skal benyttes. Et viktig eksempel er: Metadon Nordic Drugs skal brukes med forsiktighet ved diabetes. Eventuelle medisinske grunner må avklares med foreskrivende lege.

Kan jeg stole på at jeg ikke får flere bivirkninger av den nye medisinen?

Din nye og din gamle medisin inneholder det samme virksomme stoffet. Du kan derfor oppleve de samme bivirkningene. Dersom du opplever nye bivirkninger bør du snakke med legen din. Vi opplever bivirkninger av medisiner på forskjellige måter, og derfor ønsker Legemiddelverket å høre fra pasient og pårørende. Du kan melde bivirkninger inn til Legemiddelverket på www.legemiddelverket.no.

Dette brevet distribueres fra den enkelte LAR klinikk og fra brukerorganisasjonene til alle LAR-pasienter i Norge, med kopi til fastlege.